

Високопатогенний грип птиці (ВПГП)

Інформаційні матеріали:

[Брошура. На подвірних господарствах та мисливських угіддях.pdf](#) (.pdf , 764.99 Кб)

[Брошура. На комерційних господарствах.pdf](#) (.pdf , 763.57 Кб)

[Брошура. На потужностях із виробництва кормів.pdf](#) (.pdf , 779.64 Кб)

[Брошура. Під час перевезення птиці.pdf](#) (.pdf , 772.92 Кб)

[Брошура. Інструкція для власників тварин.pdf](#) (.pdf , 1.24 Мб)

ГРИП ПТИЦІ

Висококонтагіозна вірусна хвороба, що здатна вразити і свійську, і дику птицю



Перелітні птахи можуть переносити вірус у респіраторному або кишковому трактах, проте, **як правило, не хворіють**



Інкубаційний період хвороби
від декількох днів до 2 тижнів

КЛІНІЧНИМИ ОЗНАКАМИ МОЖУТЬ БУТИ



Набряк
сережок

фото з сайту
cfsph.iastate.edu




Ураження
респіраторних
органів




Набряки в
ділянці голови
та шиї

фото з сайту cabi.org



Ціаноз
гребінця та
сережок

фото з сайту cabi.org



Інтенсивна
діарея

фото з сайту cabi.org



Набряки
скакальних
суглобів та
петехії на шкірі
лап

фото з сайту cabi.org



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

ГРИП ПТИЦІ

ризики виникнення на потужностях із виробництва кормів

Висококонтагіозна вірусна хвороба, що здатна вразити і свійську, і дику птицю





У разі підозри щодо наявності хвороби у свійської чи дикої птиці, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

ГРИП ПТИЦІ на комерційних господарствах

Висококонтагіозна вірусна хвороба, що здатна вразити і свійську, і дику птицю



ємності для збору трупів

транспортні засоби

одяг і взуття



Інкубаційний період
від декількох днів
до 2 тижнів



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійської чи дикої птиці,
негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу




Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу

ГРИП ПТИЦІ під час перевезення птиці

Висококонтагіозна вірусна
хвороба, що здатна вразити і
свійську, і дику птицю




через **предмети або фоміти** (взуття, одяг, обладнання, які були забруднені джерелом вірусу)



через **прямий контакт** із інфікованою свійською або дикою птицею



виділяється з **посліду та респіраторної секреції**



Інкубаційний період
від декількох днів до 2 тижнів



Перевозьте тільки здорову птицю, за наявності **ветеринарних документів**



Перевозьте птицю тільки з перевірених **благополучних господарств**



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійської чи дикої птиці, негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу




Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу


ГРИП ПТИЦІ на подвірних господарствах та мисливських угіддях



Висококонтагіозна вірусна хвороба,
що здатна вразити і свійську, і дику
птицю




виділяється з **посліду**
та **респіраторної**
секреції



через **забруднені**
корм та воду



через **прямий контакт**
із інфікованою свійською
або дику птицею



На час міграції диких птахів домашню птицю **слід**
тримати ізолювано, у закритих приміщеннях або
вольєрах, не допускати її вигул на гуртових пасовищах,
ставках, річках та інших водоймищах, що унеможливить
контакт з дику перелітною та синантропною птицею
(горобці, ворони, голуби тощо)



через **предмети або фоміти**
(взуття, одяг, обладнання, які
були забруднені джерелом
вірусу)



У разі підозри щодо наявності хвороби у свійської чи дикої птиці,
негайно повідомте про це Держпродспоживслужбу



Цей матеріал підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу